

RESPOSTA RÁPIDA 237/2014
TAPAZOL® NO TRATAMENTO DO
HIPERPARATIREOIDISMO

SOLICITANTE	Cibele Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira Juíza de Direito
NÚMERO DO PROCESSO	0182522-27.2014.8.13.0079
DATA	07/05/2014
SOLICITAÇÃO	<p>Prezados Senhores,</p> <p>Em razão do convênio firmado pelo TJMG, solicito-lhes informações sobre o medicamento TAPAZOL 100 mg, notadamente suas indicações e efeitos em relação ao hipertireoidismo.</p>
RESPOSTAS (1-3)	<p>O hipertireoidismo é um estado hipermetabólico, causado por níveis elevados de triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) na circulação. Pode ser causada por uma variedade de distúrbios. O Tapazol®, cujo princípio ativo é o metilmazol, é uma medicação usada para tratar o hipertireoidismo.</p> <p>O propiltiouracil também é uma medicação usada no tratamento do hipertireoidismo. Age inibindo a síntese dos hormônios da tireóide que são substratos para a tireóide peroxidase, resultando no desvio do iodo na síntese dos hormônios tireoidianos. Inibe também a conversão periférica de T4 para T3, ação que pode contribuir na eficácia do tratamento de hipertireoidismo. O propiltiouracil não deve ser utilizado em crianças.</p>

	<p>O Tapazol® e o propiltiouracil pertencem a uma mesma classe de medicamentos, ou seja, as tionamidas, que tem ação antitireoidiana. Além disso, possuem eficácia semelhante no controle do hipertireoidismo.</p>
<p>CONCLUSÕES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O Tapazol® não está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Excepcionais (RENAME). Para o tratamento do hipertireoidismo o SUS disponibiliza, via RENAME, o Propiltiouracil na dose de 100mg. • Existem relatos de grave dano ao fígado e insuficiência hepática aguda, alguns casos fatais, em adultos e crianças usando a propiltiouracil. Os dados sugerem que há um risco aumentado de hepatotoxicidade com propiltiouracil quando comparado com metimazol. Por este motivo, o propiltiouracil é indicado como segunda opção no tratamento do hipertireoidismo, sendo o metimazol considerado como o tratamento de primeira linha para o hiperparatireoidismo. A exceção é válida para a gestante. Na gestante, o propiltiouracil é em geral escolhido como o medicamento de referência devido à sua menor passagem transplacentária.

REFERENCIAS

1. Bula Tapazol. Available from:
<http://www.biolabfarma.com.br/produtos/Tapazol.pdf>
2. Bula Propiltiouracil. Available from:
<http://www.biolabfarma.com.br/produtos/Propilracil.pdf>
3. http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/livro_eletronico/endocrino.html#_Toc25053250.