

NOTA TÉCNICA 4611**IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO****CÂMARA/VARA:** Vara da Infância e Juventude**COMARCA:** Montes Claros**I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:****IDADE:** 08 anos**PEDIDO DA AÇÃO:** TACROLIMO 0,03%**DOENÇA(S) INFORMADA(S):** H101**FINALIDADE / INDICAÇÃO:** “Conjuntivite Alérgica Grave”**REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:** CRMMG- 19251**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** 2023.0004611**II – PERGUNTAS DO JUÍZO:**

a) os medicamentos/insumos/equipamentos/tratamento possuem registro na ANVISA?; b) os medicamentos/insumos/equipamentos/tratamento encontram-se inclusos em listas do SUS ?; c) os medicamentos/insumos/equipamentos/tratamento ora vindicados, a despeito de serem registrados na Anvisa e encontrarem-se incluídos nas listas do SUS, encontram previsão para o quadro da parte requerente ?.

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:**DERMATITE ATÓPICA**

A dermatite atópica, também conhecida como eczema atópico, é um dos tipos mais comuns de dermatite. É definida como uma doença crônica da pele que apresenta erupções que coçam e apresentam crostas, cujo surgimento é mais comum nas dobras dos braços e da parte de trás dos joelhos. A dermatite atópica pode também vir acompanhada de asma ou rinite alérgica. As alergias oculares podem ser de vários tipos de acordo

com a presença de alterações proliferativas, dermatite atópica e a presença ou ausência de irritação mecânica.

São classificadas em conjuntivite alérgica sazonal, conjuntivite alérgica perene, ceratoconjuntivite atópica, ceratoconjuntivite vernal e conjuntivite papilar gigante. **A vernal e a atópica são tipos graves de alergia que podem causar ceratopatias como úlceras em escudo por exemplo, levando a morbidade visual em alguns casos.**

A conjuntivite alérgica crônica pode contribuir para o desenvolvimento dos quadros mais graves, caracterizados por infiltração mucosa de eosinófilos, neutrófilos, basófilos, mastócitos e linfócitos T. A fibrose subepitelial da conjuntiva, o encurtamento do fórnice e o simbléfaro podem ocorrer em casos mais graves.

Tacrolimus é eficaz no tratamento de doenças oculares inflamatórias,

Concentração usual: 0,008% – 0,015% – 0,03% – 0,05% – 0,1%

Apresentação: Colírio 5 ml – Pomada 3,5 g

Indicações:

- ✓ Úlceras de córnea periférica em pacientes atópicos refratários à terapia convencional
- ✓ Doenças oculares inflamatórias
- ✓ Cicatrização de úlcera atópicas e desordens oculares
- ✓ Uveítes

IV – CONCLUSÃO

- ✓ Tracolimus colírio está bem indicado para doença dermatite atópica com conjuntivite alérgica. .
- ✓ Tracolimus colírio não está disponível no SUS, e está bem indicado para caso de conjuntivite alérgica

V – REFERÊNCIAS:

- ✓ Portal SIGTAB
- ✓ Portal da Anvisa
- ✓ Fernández-Vega-Cueto L, Lisa C, Poo-López A, Alfonso JF, Madrid-Costa D. Eur J Ophthalmol. 2020 Jul;30(4):643-649. doi: 10.1177/1120672119835397. Epub 2019 Mar 8. PMID: 30845839

VI – DATA: 26/12 2023

NATJUS /TJMG