

RESPOSTA RÁPIDA 235/2013

SOLICITANTE	Dra. Herilene de Oliveira Andrade Juíza de Direito da Comarca de Itapeçerica - MG
NÚMERO DO PROCESSO	0335.14.889-7
DATA	13/10/2013
SOLICITAÇÃO	<p>Ao NATS,</p> <p>Solicito parecer acerca do(s) insumo(s) em uso pela parte autora quanto ao fornecimento e substituíbilidade, no prazo de quarenta e oito horas, conforme documentos médicos que seguem anexo.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p style="text-align: center;">Relatório Médico</p> <p><i>A paciente [] de 26 anos é portadora de Hipertireoidismo(Doença de Graves). Sendo que tal doença é de origem auto-imune. Foi iniciado tratamento com a medicação Tapazol de 10mg, a dose foi aumentada posteriormente para objetivar um melhor controle do quadro. No Momento está utilizando 6 Cp de Tapazol ao dia, não é possível a troca desta medicação por nenhuma outra disponível sendo que esta deve ser mantida por prazo indefinido. A paciente não deve ficar sem esta medicação, pois o Hipertireoidismo descontrolado pode inclusive levar arritmias cardíacas.</i></p>

RESPOSTAS

O Tapazol®, cujo princípio ativo é o metilmazol, é uma medicação usada para tratar o hipertireoidismo.

O Tapazol® não está incluído na RENAME.

Como alternativa, o SUS disponibiliza, via RENAME, o Propiltiouracil na dose de 100mg.

O Tapazol® (cujo princípio ativo é o metilmazol ou tiamazol) e o propiltiouracil pertencem a uma mesma classe de medicamentos, ou seja, as tionamidas, que tem ação antitireoidiana.

São igualmente eficazes no controle do hipertireoidismo.

Entretanto, o propiltiouracil está associado a riscos um pouco maiores de efeitos tóxicos, sobretudo de toxicidade para o fígado (hepatotoxicidade).

Nos Estados Unidos, o propiltiouracil é indicado pelo FDA como segunda opção no tratamento do hipertireoidismo, sobretudo quando o paciente desenvolve reações adversas ao metilmazol (Tapazol) e para mulheres no primeiro trimestre de gravidez. O FDA não indica o Propiltiouracil para crianças.

No caso da paciente, o hipertireoidismo grave foi controlado com o uso de Tapazol. Como o relatório informa haver contra indicação à substituição do Tapazol por outro medicamento, e trata-se de doença de difícil controle, o medicamento está indicado corretamente.