

RESPOSTA RÁPIDA 07/2013

SOLICITANTE	Sr Dr. Marco Aurélio Ferenzini Juiz de Direito
NÚMERO DO PROCESSO	
DATA	05/02/2013
SOLICITAÇÃO	<p>Solicito informações sobre a utilização do medicamento TELAPREVIR no tratamento de Hepatite C, bem como:</p> <ol style="list-style-type: none">1) existe algum medicamento genérico com o mesmo princípio ativo?2) existe algum medicamento nacional com o mesmo princípio ativo?3) o sistema público de saúde fornece o TELAPREVIR ou algum substituto - nacional ou genérico?4) outros esclarecimentos que forem de interesse sobre o medicamento TELAPREVIR.

RESPOSTAS

Pergunta 1- Existe algum medicamento genérico com o mesmo princípio ativo?

Não. O único medicamento está disponível apenas pelo nome comercial “Incivo”. Foi registrado em outubro de 2011 pela ANVISA.

Pergunta 2 – Existe algum medicamento nacional com o mesmo princípio ativo?

Não. O medicamento “Incivo” é fabricado na Itália pela Janssen-Cilag SpA e importado para o Brasil pela Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.

Pergunta 3 – O sistema público de saúde fornece o TELAPREVIR ou algum substituto - nacional ou genérico?

Sim. Em abril de 2012, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), após consulta pública, aprovou a incorporação de dois novos medicamentos, boceprevir e telaprevir, para tratamento da infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) tipo 1, que deverá estar disponível a partir de 2013.

Pergunta 4 – Outros esclarecimentos que forem de interesse sobre o medicamento TELAPREVIR.

Há protocolo específico de indicações, dose e avaliação de resposta do telaprevir, publicado pelo Ministério da Saúde recentemente. A referência é citada abaixo.

“Inibidores de Protease (Boceprevir e Telaprevir) para o tratamento da Hepatite Crônica C. Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC - 01. [Acesso em 5/02/2013]. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Rel_IP_HepatiteC.pdf”

Está recomendado o uso de Telaprevir nos pacientes infectados pelo tipo 1 do HCV, com cirrose em graus mais avançados, em três situações: a) que não tiveram nenhuma resposta; b) não responderam adequadamente à primeira linha de tratamento ou c) nos casos de progressão da doença, apesar de resposta inicial à primeira linha de tratamento.

Os medicamentos devem ser fornecidos e seus resultados acompanhados em Centros de Referência em Tratamento da Hepatite C no SUS.