

NOTA TÉCNICA: 3865**IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO****CÂMARA/VARA:** Cartório 19 Cível**COMARCA:** Pedro Leopoldo**I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:****IDADE:** 11 anos**PEDIDO DA AÇÃO:** Domperidona / Esomeprazol**DOENÇA(S) INFORMADA(S):** Epilepsia**FINALIDADE / INDICAÇÃO:** Elaboração de parecer Técnica**REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:** CRMMG-**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** 2023.0003865**II – PERGUNTAS DO JUÍZO:**

Para elaborar parecer referente ao caso, mormente em relação à enfermidade da parte autora e à necessidade e imprescindibilidade do tratamento indicado.

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

Esomeprazol (esomeprazol magnésico) é indicado para o tratamento de doenças ácido-pépticas e alívio dos sintomas de azia, regurgitação ácida e dor epigástrica. Não disponível no SUS. Como alternativa o SUS disponibiliza o omeprazol através do componente básico de assistência farmacêutica, na apresentação de cápsulas de 10 e 20 mg. Vide RENAME páginas 29 e 90. Os estudos que compararam a eficiência do omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol e rabeprazol na redução da acidez do estômago, obtiveram resultados equivalentes. Não foi identificado elemento técnico indicativo de imprescindibilidade de uso específico do medicamento requerido em detrimento da alternativa terapêutica disponível na rede pública.

O medicamento domperidona é destinado ao tratamento de:

- Síndromes dispépticas frequentemente associadas a um retardo de esvaziamento gástrico, refluxo gastroesofágico e esofagite:
 - Sensação de empachamento epigástrico, saciedade precoce, distensão abdominal, dor abdominal alta; - eructação, flatulência;
 - Náuseas e vômitos;
 - Azia, queimação epigástrica com ou sem regurgitação de conteúdo gástrico.
- Náuseas e vômitos de origem funcional, orgânica, infecciosa ou alimentar ou induzidas por radioterapia ou tratamento medicamentoso (anti-inflamatórios, antineoplásicos).

Uma indicação específica são as náuseas e vômitos induzidos pelos agonistas dopaminérgicos usados no tratamento da Doença de Parkinson como a L-dopa e bromocriptina. Revisão sistemática que avaliou o uso de domperidona em paciente de 1 a 11 anos com refluxo gastro-esofágico conclui que não existem evidências sólidas para uso deste medicamento. Revisão sistemática sobre a eficácia da domperidona para tratamento do gastroparesia diabética conclui que não ha provas suficientes para apoiar o uso da domperidona nessa patologia. A medicação não disponível no SUS, como alternativa está disponível metoclopramida. Estudos que compararam uso demperidona e metoclopramida em paciente com gastrite endoscopicamente confirmandos mostraram resultados semelhantes no alivio dos sintomas

IV – CONCLUSÃO:

- ✓ A medicação solicitada está bem indicada para o quadro clinico apresentado
- ✓ A medicação não está disponível no SUS

- ✓ Existem alternativas no SUS quem podem ser utilizadas no caso em tela sem prejuízo para o paciente

V – REFERÊNCIAS:

- ✓ NOTA TÉCNICA AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE (ATS)
Nº 643 TJ - CE
- ✓ Nota Técnica 70/2012 Consultoria / Advocacia Geral da União

VI – DATA: 21/11/2023

NATJUS/TJMG