

RESPOSTA RÁPIDA 426/2013

Stavigile na narcolepsia

SOLICITANTE	Dra. Renata Abranches Perdigão Juíza de Direito do JESP da Fazenda Pública de Campo Belo
NÚMERO DO PROCESSO	112.13.009463-7
DATA	18/12/2013
SOLICITAÇÃO	<p>Como assistente da Juíza de Direito Dra. Renata Abranches Perdigão do JESP da Fazenda Pública de Campo Belo, solicito parecer técnico para o caso descrito abaixo.</p> <p>Att. Valéria Suzane</p> <p>Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por R.M. em face do MUNICÍPIO DE CAMPO BELO.</p> <p>Alegou o (a) requerente que é portadora de narcolepsia, que é uma patologia psiquiátrica que causa sonolência diurna excessiva, com risco de dormir em locais inapropriados, inclusive na via pública. O medicamento indicado para tal patologia é o Stavigile, 200mg, de uso contínuo, contudo, a autora não pode comprá-lo por se tratar de pessoa pobre.</p>
RESPOSTA	Narcolepsia significa ataque de sono (narco significa estupor e lepsia, ataques). Atualmente é definida por sonolência excessiva diurna e cataplexia, podendo associar-se a paralisia do sono, alucinações hipnagógicas e fragmentação do sono. (1)

RESPOSTA

Stavigile (Modafinila) – Este medicamento é destinado ao tratamento da narcolepsia, auxiliando na manutenção do estado de vigília. Auxilia no controle da sonolência excessiva causada por esta condição e reduz a probabilidade de ocorrência dos episódios de sono Incontroláveis.

A medicação não é fornecida pelo SUS.

O preço máximo ao consumidor do STAVIGILE - 200 MG é de R\$ 179,55 (2)

As Diretrizes Brasileiras para o Tratamento da Narcolepsia (3) indicam as seguintes medicações na terapêutica da doença: modafinila, anfetaminas, metilfenidato, selegilina, antidepressivos tricíclicos e antidepressivos inibidores da recaptção da serotonina e noradrenalina. Modafinila é indicada como a primeira escolha para o tratamento da sonolência diurna. Agentes de segunda escolha para o tratamento da SE são metilfenidato de liberação lenta, seguido pelo mazindol. Reboxetina, clomipramina, venlafaxina, desvenlafaxina e doses altas de ISRS são a primeira escolha para o tratamento da cataplexia. Hipnóticos são utilizados para o tratamento do sono noturno fragmentado. Antidepressivos e hipnóticos são igualmente utilizados para o tratamento das alucinações hipnagógicas e paralisia do sono.

Atenção: Após revisão da informação destes medicamentos, o Comitê de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da EMA (Agência Europeia de Medicamentos) recomendou o seguinte:

- O benefício destes medicamentos só é superior aos seus riscos no caso da narcolepsia. Nas restantes situações, o risco de desenvolver reações cutâneas, de hipersensibilidade ou alterações neuropsiquiátricas não compensa o benefício da utilização deste medicamento;

- **O modafinil não deve ser prescrito a crianças**, uma vez que os potenciais riscos de desenvolver reações adversas cutâneas e de hipersensibilidade graves são superiores nesta população.⁴

	<p>Conclusão</p> <p>Stavigile® -modafinila é indicada como a primeira escolha para o tratamento da sonolência diurna</p>
--	---

- (1) Disponível em: <http://www.hcnet.usp.br/ipg/revista/vol34/n3/133.html>
- (2) Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/83aa480040290028a81ff8dc5a12ff52/LISTA+CONFORMIDADE_2013-06-28.pdf?MOD=AJPERES
- (3) Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbp/v32n3/16.pdf>
- (4) Disponível em:
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_ALERTAS/DETALHE_ALERTA?itemid=3322199