

Data: 25/01/2013

NT 01/2013

Medicamento	x
Material	
Procedimento	
Cobertura	

Solicitante

Juiza Lorena Teixeira Vaz Dias
Processo nº 0000804-11.2013.8.13.0604

TEMA: Venvanse® e Luvox® no transtorno obsessivo compulsivo.

Sumário

1. Resumo executivo.....	2
1.1. Contextualização.....	2
1.2. Considerações	2
1.3. Conclusão	3
2. Análise Clínica da Solicitação	3
2.1. Pergunta estruturada.....	3
2.2. Contextualização ¹	3
2.3. Descrição da Tecnologia a ser avaliada.....	4
2.3.1. VENVANSE®	4
2.3.2. LUVOX®.....	4
3. Resultado da Revisão da Literatura	5
4. Considerações	5
5. Conclusão	5
6. Referências	5

Informações encaminhadas

Apreciação de pedido de liminar de fornecimento dos medicamentos Venvanse® 30 mg (3 comp. ao dia) e Luvox® 100mg (1comp. ao dia), para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo e depressão. O paciente já utilizou os seguintes medicamentos: Rivotril, Anafranil, Haldol, Citalopram, Frontal e outros.

1. RESUMO EXECUTIVO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O transtorno obsessivo compulsivo (TOC) é um transtorno de ansiedade caracterizado por pensamentos obsessivos. Estes pensamentos são ideias persistentes, impulsos ou imagens que ocorrem de forma invasiva na mente da pessoa, gerando muita ansiedade e angústia.

A pessoa portadora de TOC tenta ignorá-los ou eliminá-los através de ações que são intencionais e repetitivas. Geralmente reconhece que seu comportamento é excessivo ou que não há muita razão para fazê-lo.

As obsessões ou compulsões acarretam grande estresse, consomem tempo (mais de uma hora por dia) ou interferem bastante na rotina normal, no trabalho ou nas atividades sociais e relacionamentos interpessoais.

1.2. CONSIDERAÇÕES

VENVANSE® é um medicamento indicado para Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade. O diagnóstico de déficit de atenção não consta dos laudos.

Luvox® - Este medicamento é destinado ao tratamento de episódios depressivos, do transtorno depressivo maior e do Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). O medicamento alternativo fornecido pelo SUS é a clomipramina, que tem o mesmo resultado clínico segundo estudos realizados.

1.3. CONCLUSÃO

Com os dados fornecidos, não há justificativa para utilizar Venvanse®, a não ser que o paciente seja portador também de déficit de atenção. O medicamento pode estar contraindicado se o paciente apresentar muita agitação.

Cabe ao médico justificar a necessidade do uso do Luvox®, em detrimento da clomipramina prevista no protocolo de fornecimento da Secretaria Municipal de Saúde.

2. ANÁLISE CLÍNICA DA SOLICITAÇÃO

2.1. PERGUNTA ESTRUTURADA

População: paciente com diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo

Intervenção: Luvox® e Venvase®

Comparação: Clomipramina

Desfecho: Melhor qualidade de vida, melhor controle da doença.

2.2. CONTEXTUALIZAÇÃO¹

O TOC abrange um amplo espectro de sintomas que representam múltiplos domínios psicopatológicos, incluindo percepções, cognições, emoções, relacionamentos sociais e diversos comportamentos motores.¹

As **obsessões** são definidas como ideias, pensamentos, impulsos ou imagens que são vivenciados como intrusivos e inadequados e causam acentuada ansiedade ou sofrimento; enquanto as **compulsões** são comportamentos repetitivos ou atos mentais cujo objetivo é prevenir ou reduzir a ansiedade ou sofrimento, ao invés de oferecer prazer ou gratificação; geralmente ou são excessivas ou não têm conexão realista com aquilo a que visam neutralizar ou evitar³. Os conteúdos das obsessões são vários, como por exemplo: obsessões de contaminação, dúvidas repetidas, necessidade de organização, impulsos agressivos ou horrorizantes e imagens sexuais. Exemplos de compulsões são: lavagem/limpeza, verificação, contagem, colecionismo, simetria, entre outros.¹

A prevalência na população em geral tem revelado valores em torno de 2%.¹

2.3. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA A SER AVALIADA

2.3.1. VENVANSE®

Fabricante: Shire do Brasil

Princípio ativo: dimesilato de lisdexanfetamina

Indicação de bula: tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. ²

Preço: R\$ 218,51/mês³

Disponibilidade no SUS:

Não.

Para tratamento do déficit de atenção, o SUS fornece os medicamentos cloridrato de amitriptilina, cloridrato de clomipramina, cloridrato de nortriptilina e cloridrato de fluoxetina (antidepressivos); haloperidol e clorpromazina (antipsicóticos); clonazepam e diazepam (benzodiazepínicos ansiolíticos), por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema.⁴

2.3.2. LUVOX®

Fabricante: SOLVAY FARMA

Princípio ativo: Maleato de fluvoxamina

Indicação de bula: tratamento da depressão e dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo.⁵

Preço: R\$ 128,97/mês³

3. RESULTADO DA REVISÃO DA LITERATURA

Os tratamentos farmacológicos de primeira linha para o TOC são os inibidores de receptação de serotonina (IRS), classe de medicamentos antidepressivos que incluem os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS) e a clomipramina (tricíclico). Metanálises demonstram que a clomipramina é mais efetiva que os IRS.

Um estudo randomizado controlado comparou clomipramina e fluvoxamina no tratamento do TOC e não houve diferença significativa entre os dois tratamentos.⁶

4. CONSIDERAÇÕES

Considerando que **VENVANSE®** é um medicamento indicado para Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade e não para TOC e o diagnóstico de déficit de atenção não consta dos laudos;

Considerando que o paciente tem diagnóstico de Transtorno obsessivo compulsivo e ainda não utilizou clomipramina, oferecido pelo SUS;

Considerando que estudos mostram a mesma eficácia de Luvox® (fluvoxamina) e clomipramina;

5. CONCLUSÃO

Com os dados fornecidos, não há justificativa para utilizar Venvanse®, a não ser que o paciente seja portador também de déficit de atenção. O medicamento inclusive pode estar contraindicado se o paciente apresentar muita agitação.

Cabe ao médico justificar a necessidade do uso do Luvox®, em detrimento da clomipramina prevista no protocolo de fornecimento da Secretaria Municipal de Saúde.

6. REFERÊNCIAS

1. Ygor Arzeno Ferrão. Características clínicas do transtorno obsessivo-compulsivo refratário aos tratamentos convencionais. Tese de Doutorado

UFRGS. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/toc/Tesededoutorada.pdf> Acesso em: 5/01/2013.

2. Bula Venvanse®. Disponível em:

http://www.shire.com.br/PDF/Venvanse_20120523_Bula%20do%20Paciente.pdf

f. Acesso em 25/01/13

3. CMED. Preço de medicamentos. Acesso em: 26/01/2013. Disponível em:

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Pos++Comercializacao++Pos++Uso/Regulacao+de+Mercado>; acesso em 25/01/2013

4. Bula Luvox®. Disponível em:

[http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM\[35498-1-0\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[35498-1-0].PDF). Acesso em 25/01/13

5. Metilfenidato. Ministério da Saúde. Disponível em:

<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Out/08/metilfenidato.pdf>, acesso em 25/01/2013

6. Koran LM, McElroy SL, Davidson JR, Rasmussen SA, et al. Fluvoxamine vs. clomipramine for obsessive compulsive disorder : a double-blind comparison. *Journal of Clinical Psychopharmacology* 1996;16: 121–129.